

Kingloba®

Viên nang mềm

1.Thành phần:

Cao khô lá Bạch quả (*Extractum Folii Ginkgo siccus* tương ứng với 1,6g dược liệu lá Bạch quả).....40mg
Tá dược vừa đủ.....1 viên
(Tá dược: Lecithin, Sáp ong, Dầu đậu nành, Glycerin, Gelatin, Titan dioxyd, Nipagin (0,168 mg), Nipazol (0,053 mg), Vanilin, màu xanh Green Mint, màu nâu oxyd sắt).

2.Dạng bào chế: Viên nang mềm.

3.Tính chất:

- Bạch quả (*Ginkgo biloba Ginkgoaceae*) là một dược liệu quý giúp tăng tuần hoàn máu đến não và các mô ngoại biên, tăng cường cung cấp oxygen cũng như năng lượng cho mô não và mô ngoại biên. *Ginkgo biloba* được dùng trong điều trị các rối loạn tuần hoàn máu não và các vi mao mạch với các dấu hiệu: chóng mặt, nhức đầu, ù tai, suy giảm trí nhớ, kém tập trung, hay gắt bắn ở người lớn tuổi, ngủ gà ngủ gật, đi khập khiễng cách hồi, tê cứng chân tay.

- Ngoài ra, trong cao Bạch quả còn chứa flavonoid và terpenoid là các chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng trung hòa các gốc tự do.

4.Quy cách đóng gói:

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

5.Công năng, chủ trị:

Phòng và điều trị các chứng bệnh:

- Thiếu máu não: suy giảm trí nhớ, kém tập trung, hay gắt bắn ở người lớn tuổi, ngủ gà ngủ gật, chóng mặt, nhức đầu, ù tai.
- Cải thiện triệu chứng đau mỏi cách hồi.
- Rối loạn tuần hoàn máu ở mắt: bệnh võng mạc ở người bệnh đái tháo đường, thoái hóa điểm vàng ở người tuổi già.
- Cải thiện hội chứng Raynaud.

6.Liều lượng và cách dùng:

- Rối loạn chức năng não: uống 1 - 2 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Rối loạn tuần hoàn ngoại biên: uống 1 viên/lần x 3 lần/ngày hoặc 2 viên/lần x 2 lần/ngày.

7.Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Bệnh nhân sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu (aspirin) hoặc thuốc chống đông máu (warfarin), bệnh nhân thiếu vitamin K.
- Bệnh nhân có tiền sử hoặc khuynh hướng co giật.
- Bệnh nhân bị rối loạn đông máu, đang có xuất huyết.

8.Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc:

8.1.Thận trọng:

- Tăng nguy cơ chảy máu nên ngừng dùng thuốc 36 giờ trước khi phẫu thuật hoặc thực hiện các thủ thuật nha khoa.
- Người bị bệnh đái tháo đường nên hỏi Bác sĩ trước khi dùng.

8.2.Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không nên dùng *ginkgo biloba* cho phụ nữ có thai và cho con bú vì chưa có tài liệu chứng minh tính an toàn của thuốc trên những đối tượng này.

8.3.Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy:

Không nên dùng chế phẩm có chứa *ginkgo biloba* khi lái xe và vận hành máy.

9.Tương tác thuốc và các loại tương tác khác:

- Tăng nguy cơ chảy máu ở những người dùng đồng thời với các thuốc chống kết tập tiểu cầu: aspirin, abuprofen, warfarin, dipyridamol, ticlodipin, heparin,..
- Tăng nguy cơ hôn mê ở những bệnh nhân dùng thuốc chống trầm cảm (trazodone), tăng tác dụng của nifedipine.
- Giảm nồng độ omeprazol, tolbutamide trong máu.

10.Tác dụng không mong muốn:

- Hiếm gặp: rối loạn tiêu hóa nhẹ, nhức đầu, chóng mặt, tim đập nhanh hoặc dị ứng (mẩn đỏ, sưng, ngứa)
- Kéo dài thời gian chảy máu được ghi nhận ở một số trường hợp cá biệt sau khi điều trị dài ngày với các thuốc có thành phần chứa *ginkgo biloba*.

11.Quá liều và cách xử trí:

Kingloba® rất dễ dung nạp, cho đến nay các triệu chứng quá liều chưa được ghi nhận.

12.Các dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo:

Chưa tìm thấy thông tin.

13.Điều kiện bảo quản, hạn dùng của thuốc

13.1.Điều kiện bảo quản:

Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

13.2.Hạn dùng:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

14.Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TTBYT BÌNH ĐỊNH
(BIDIPHAR)**

498 Nguyễn Thái Học - P.Quang Trung - Tp.Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định - Việt Nam

ĐT:0256.3846040 - 0256.3847098 *Fax: 0256.3846846

15.Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng: 29/11/2017