

Hướng dẫn sử dụng thuốc  
Rx - Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

## THUỐC HO BỔ PHẾ CHỈ KHÁI LÔ

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM  
THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SỸ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG  
MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC

### Thành phần công thức thuốc:

Thành phần dược chất:	
Cao đặc hỗn hợp tương đương {Bạch linh ( <i>Poria</i> ) 0,576g, Cát cánh ( <i>Radix Platycodi Grandiflori</i> ) 1,092g, Tý bà diệp ( <i>Folium Eriobotryae</i> ) 2,88g, Tang bạch bì ( <i>Cortex Mori Albae Radicis</i> ) 2,0g, Ma hoàng ( <i>Herba Ephedrae</i> ) 0,42g, Mạch môn ( <i>Radix Ophiopogonis Japonici</i> ) 0,772g, Bạc hà ( <i>Herba Menthae</i> ) 1,864g, Bán hạ ché ( <i>Rhizoma Pinelliae</i> ) 1,336g, Bách bộ ( <i>Radix Stemonaes Tuberosae</i> ) 2,986g, Ma muối ( <i>Fructus Armeniacae Praeparatus</i> ) 1,3g, Cam thảo ( <i>Radix Glycyrrhizae</i> ) 0,378g, Bạch phàn ( <i>Alumen</i> ) 0,132g}	2,12 g
Tinh dầu bạc hà ( <i>Oleum Menthae arvensis</i> )	0,08g
Thành phần tá dược: (Đường trắng, Acid benzoic, Ethanol 90%, Nước RO) vừa đủ	80 ml
Dạng bào chế:	

Siro, chất lỏng hơi sánh, màu nâu vàng, mùi thơm của tinh dầu bạc hà.

### Chỉ định:

Tiêu đờm, giảm ho. Chữa các chứng ho, ho do cảm, ho gió, ho khan, ho lâu ngày, viêm phế quản.

### Cách dùng - Liều dùng:

- Trẻ em: Từ 30 tháng tuổi đến 6 tuổi uống 5 ml/lần x 3 lần/ngày

Từ 7 - 10 tuổi uống 10 ml/lần x 3 lần/ngày.

- Người lớn: uống 15 ml/lần x 3 lần/ngày.

### Chống chỉ định:

Không dùng cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao, người tiểu đường.

### Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Chưa có báo cáo.

### Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

- Chưa có báo cáo về sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

### Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Không ảnh hưởng.

### Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Chưa có báo cáo.

### Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Quá liều và cách xử trí:

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều. Không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

- Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

### Quy cách đóng gói:

- Hộp 20 gói x 5ml + HDSD.

- Hộp 25 gói x 5ml + HDSD.

- Hộp 10 gói x 10ml + HDSD.

- Hộp 1 lọ 80ml (lọ PET nâu) + HDSD.

- Hộp 1 lọ 100ml (lọ PE trắng) + HDSD.

- Hộp 1 lọ 100ml (lọ PET nâu) + HDSD.

- Hộp 1 lọ 125ml (lọ PET nâu) + HDSD.

- Hộp 1 lọ 150ml (lọ PET nâu) + HDSD.

Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

Bảo quản: Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM

Đường Lê Chân, Khu Công Nghiệp Chùa Sơn, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

ĐT: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143