

## TƯ ÂM THANH PHẾ

"Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"

### THÀNH PHẦN CÔNG THỨC:

- 120 ml cao lỏng chứa các dịch chiết được từ các dược liệu tương ứng:

Sinh địa ( <i>Radix Rehmanniae glutinosae</i> )	32,0 g
Mạch môn ( <i>Radix Ophiopogonis</i> )	24,0 g
Huyền sâm ( <i>Radix Scrophulariae</i> )	24,0 g
Cam thảo ( <i>Radix Glycyrrhizae</i> )	16,0 g
Bối mẫu ( <i>Blubus Fritillariae</i> )	12,0 g
Bạch thược ( <i>Radix Paeoniae lactiflorae</i> )	12,0 g
Đan bì ( <i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i> )	12,0 g
- Tá dược (Tinh dầu Bạc hà, Acid Benzoic, Đường kính) và Nước tinh khiết v.đ	120 ml

**DẠNG BÀO CHẾ:** Cao lỏng

**CÔNG NĂNG:** Dưỡng âm thanh phế, lương huyết giải độc.

### CHỈ ĐỊNH:

- Viêm họng mãn tính, ho do viêm họng.
- Viêm amidan cấp.
- Bệnh bạch hầu.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

**CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:** Ngày uống 2 đến 3 lần.

- Trẻ em (tùy theo tuổi):

- + Dưới 2 tuổi mỗi lần uống 1 thìa cà phê (5ml).
- + Từ 2 đến 6 tuổi mỗi lần uống 1 đến 2 thìa cà phê (5-10ml).
- + Từ 6 đến 15 tuổi mỗi lần uống 2-3 thìa cà phê (10-15 ml).
- + Trên 15 tuổi: như liều người lớn.

Người lớn: Mỗi lần uống 1 đến 2 thìa canh (15ml- 30 ml).

**CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:** Chưa thấy có tài liệu ghi nhận.

Thuốc có đường nên thận trọng khi dùng cho người tiểu đường.

**SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ NUÔI CON BÚ:** Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và nuôi con bú.

**ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:**

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

**TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC:**

- Tương tác: Chưa thấy có tài liệu ghi nhận.
- Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Chưa ghi nhận báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:**

- Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- Cách xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:**

- Hộp 1 lọ 60 ml cao lỏng, Hộp 1 lọ 90 ml cao lỏng và Hộp 1 lọ 120 ml cao lỏng.
- Gói 5 ml, Hộp 12 gói và hộp 20 gói.
- Gói 15 ml, hộp 12 gói.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô mát, tránh ánh sáng, dưới 30°C.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS.

Nhà sản xuất:



BAO PHUONG PHARMA

**CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT BẢO PHƯƠNG**

Thôn Thắng Đầu, Hoà Thạch, Quốc Oai, Hà Nội

Tel: 024 33555656 - Fax: 024.33825184