

RX - Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

Viên nén phân tán

Alphachymotrypsin ODT

ĐỂ THUỐC XA TẮM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SỸ

THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SỸ HOẶC ĐƯỢC SỸ NHỮNG TÁC DỤNG

KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC:

1 viên

Thành phần được chất:

Alphachymotrypsin (Chymotrypsin).....4200 IU (hay 21 microkatal)

Thành phần tá dược bao gồm: Arboceol M80, Đường saccharose, Avicel M101, Lycatab PGS, Compri M3, Crospovidon, Mannitol, Saccharin natri, Aerosil, Magnesi stearat, Hương bạc hàvừa đủ.....1 viên nén phân tán

DẠNG BÀO CHẾ: viên nén phân tán.

MÔ TẢ SẢN PHẨM: Viên nén tròn màu trắng, hai mặt trơn, vị ngọt, hương bạc hà, cạnh và thành viên lành lặn.

CHỈ ĐỊNH:

Dùng trong điều trị phù nề sau chấn thương, phẫu thuật, bỏng.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Dùng theo chỉ định của thầy thuốc.

Ngậm: 4-6 viên/ngày.

Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn với alphachymotrypsin hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

Không dùng alphachymotrypsin cho người bệnh tăng áp suất dịch kính và có vết thương hở hoặc người bệnh đục nhân mắt bẩm sinh.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Phụ nữ có thai: Đến nay chưa ghi nhận tác dụng độc hại nào nên có thể dùng được cho phụ nữ có thai.

Phụ nữ cho con bú: Chưa có tài liệu nghiên cứu nên được khuyến không nên dùng

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không gây tác dụng không mong muốn buồn ngủ nên có thể sử dụng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC:

Không có.
Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất của alphachymotrypsin là tăng nhất thời nhân áp do các mảnh vụn dây chằng bị tiêu hủy làm tắc mạch bó dây.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Triệu chứng: Ở chuột nhắt, chuột cống, thỏ và chó; LD50 = 24.000 - 85.000 đv/kg. Gây chảy máu nhiều cơ quan. Ở người chưa thấy báo cáo. Có thể gây sốc phản vệ

Xử trí: Ngưng sử dụng thuốc, điều trị hỗ trợ triệu chứng

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC:

Alphachymotrypsin là enzym phân giải protein, được điều chế bằng cách hoạt hóa chymotrypsinogen, chiết xuất từ tụy bò.

Alphachymotrypsin đặc biệt cắt các liên kết chuỗi các acid amin thơm.

Alphachymotrypsin cũng được sử dụng nhằm giảm viêm và phù nề do áp xe và loét, hoặc do chấn thương và nhằm giúp làm lỏng các dịch tiết đường hô hấp trên ở người bệnh hen, viêm phế quản, các bệnh phổi và viêm xoang.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC:

chưa có tài liệu nghiên cứu.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 2 vỉ x 10 viên nén phân tán, hộp 10 vỉ x 10 viên nén phân tán, hộp 50 vỉ x 10 viên nén phân tán.

BẢO QUẢN - HẠN DÙNG:

Bảo quản: Dưới 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: TCCS



WHO - GMP

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA

Đường 2/4, khóm Đông Bắc, phường Vĩnh Hòa,

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa